

INSTRUCTIUNI DE RECOLTARE PENTRU EXAMENUL COPROPARAZITOLOGIC

COLECTAREA MATERIILOR FECALE PENTRU DETECTAREA PARAZIȚILOR TREBUIE EFECTUATĂ:

- Înainte de examenul radiologic gastrointestinal baritat sau la 10 zile după efectuarea acestuia.
- La cel puțin două săptămâni de la administrarea de antibiotice (metronidazol sau tetraciclină).
- La minim o săptămână de la administrarea de uleiuri minerale, bismut, antidiareice și preparate.

RECOLTARE

Înainte și după recoltare pacientul se va spala pe mâini.

Pentru recoltare folosiți recipientul adecvat. NU se utilizează recipiente cu mediu de transport. Recoltarea se poate face din materiile fecale emise în orice moment al zilei, câte o porțiune de mărimea unei alune din 3 locuri diferite ale bolului fecal (max. jumătate de recipient).

ESTE CONTRAINDICAT CONTACTUL PROBEI CU APĂ SAU URINĂ.

După prelevare se recomandă ca proba să ajungă la laborator în cel mai scurt timp pentru examinare.

Din cauza eliminării intermitente a paraziților în fecale, pentru a exclude o infecție parazitară intestinală, se recomandă:

EFECTUAREA A MINIMUM 3 EXAMENE COPROPARAZITOLOGICE RECOLTATE LA INTERVALE DE 7-10 ZILE.

Excepție o reprezintă suspiciunea de infecție amoebiană pentru care sunt recomandate 6 examene coproparazitologice.

Trei examinări sunt recomandate și, în caz de verificare a eficienței terapiei după tratamentul unor parazitoze intestinale. Recoltarea se face la 3-4 săptămâni de la terminarea tratamentului pentru protozoare și la 5-6 săptămâni pentru specii de Taeniae.