

## SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU

### INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE PENTRU SUMARUL DE URINĂ ȘI UROCULTURĂ

RECOLTAREA se face dimineata, din prima urina sau la 3 ore de la mictiunea anterioara, intr-un recipient ,curat , uscat ,cu capac, de unica utilizare. Pacientul se va spala pe maini inainte si dupa recoltare.

Se spală zona genitală cu apă și săpun. Pentru a preveni contaminarea probei, evitați contactul zonei spălate cu orice obiect (gura recipientului, prosopul, hârtia, lenjeria intimă etc.).

#### PARTICULARITĂȚI ALE IGIENEI LOCALE ÎN FUNCȚIE DE SEX

##### BARBATI:

- Se retractează prepuțul pentru a decalota complet glandul.
- Acesta se spală abundant cu apă și săpun, după care se usucă cu două tampoane de tifon sterile, cu utilizare unică, procedând din față către fren.
- Menținând în continuare glandul decalotat, se recoltează proba de urină.

##### FEMEI:

- La femeile active sexual se recomandă utilizarea unui tampon intravaginal pentru a nu contamina proba urinară cu secreție vaginală.
- După spălare, zona vulvară decontaminată se șterge cu 2 tampoane de tifon sterile prin mișcare unică din față spre spate.
- Se recomandă ca pacienta să îndepărteze cu degetele labiile, astfel încât jetul urinar să nu ia contact cu acestea sau cu părul pubian.

Din prima urină de dimineață pacientul va urina o cantitate mică în toaletă și, fără să se oprească, va colecta în recipientul primit de la laborator urina din jetul mijlociu, o cantitate de cca 10-15 ml, in recipient separate pentru SUMARUL DE URINĂ și pentru UROCULTURĂ.

Pentru urocultură se folosește un recipient steril de unica utilizare care se deschide doar în momentul recoltării probei. Se va evita atingerea recipientului în interior sau de zona genitală.

După recoltare, probele se păstrează la temperatura camerei (18-25°C) și vor fi aduse la laborator în cel mult 2 ore. În situația în care transportul către laborator nu se poate efectua în două ore, proba își menține stabilitatea refrigerată (4°C) pentru maxim 24 ore.

#### SE VA MENȚIONA PE BILETUL DE TRIMITERE LA LABORATOR:

- Dacă pacientul este în curs de tratament cu antibiotice sau dacă este urocultură de control după tratament cu antibiotic.
- Dacă proba este recoltată din sondă sau prin puncție suprapubiană.